

Protection des pollinisateurs :

Meilleures pratiques de gestion pour l'application foliaire



- **Lisez toujours l'étiquette du pesticide et suivez les instructions qui y figurent.**
- **Si l'étiquette indique que le produit peut être toxique pour les abeilles :**
 - Soyez conscient de l'emplacement des ruches.
 - Informez les apiculteurs des environs de vos plans de pulvérisation.
 - Évitez de pulvériser lorsque les cultures (ou les mauvaises herbes) sont en fleurs.
 - Pulvériser le soir, quand les abeilles sont moins susceptibles de butiner.
 - Évitez de pulvériser pendant la floraison, mais si nécessaire, pulvériser le soir, quand les abeilles sont moins susceptibles de butiner (si le profil d'emploi est autorisé sur l'étiquette), et envisagez de couper les fleurs présentes avant l'application.
- **Réduisez la dérive de pulvérisation :**
 - Vérifiez les prévisions météo avant l'application et tenez compte des changements météo durant l'application, afin de réduire la dérive.
 - Pulvériser quand les températures sont fraîches ou que l'humidité est élevée.
 - Ne pulvériser pas dans les situations où des inversions de température peuvent se produire.
 - Utilisez une buse antidérive, si possible, et calibrez régulièrement le matériel de pulvérisation.
 - Produisez des gouttelettes de taille moyenne ou grosse, si possible.
 - Si vous utilisez un pulvérisateur à jet porté, installez des déflecteurs ou fermez les buses hors cible.
 - Installez des déflecteurs coniques ou des écrans sur les pulvérisateurs afin de réduire la dérive hors champ.
 - Pour les pulvérisations aériennes, assurez-vous que la largeur maximale de la rampe n'excède pas 65 % de l'envergure des ailes de l'avion.
 - Envisagez d'incorporer un agent réducteur de dérive dans les bouillies de pulvérisation, s'il y a lieu, afin de garantir des gouttelettes de taille homogène et une application ciblée.
- **Traitez uniquement le secteur cible :**
 - Respectez la zone tampon indiquée sur l'étiquette.
 - Désactivez la pulvérisation lors des demi-tours en bout de champ, près des grosses flaques ou des sources d'eau, ou à proximité d'autres secteurs écologiquement fragiles.
 - Fermez les buses lorsqu'il y a des trous dans les cultures.
- **Tenez compte des lieux attractifs pour les abeilles butineuses qui se trouvent près du secteur que vous traitez. Même si la culture que vous pulvériser n'attire pas les abeilles, cela ne signifie pas qu'elles n'y sont pas présentes.**

Pour de plus amples renseignements sur la santé des pollinisateurs et les meilleures pratiques de gestion, veuillez consulter [la page de Santé Canada sur la protection des pollinisateurs.](#)